



QUATOVET 10L - preparat dezynfekujący

Cena brutto	450,90 zł
Cena netto	417,50 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

Quatovet - preparat do dezynfekcji 10 L

WŁAŚCIWOŚCI:

QUATOVET to płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w higienie weterynaryjnej, obiektów użyteczności publicznej i prywatnej oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

Ma działanie bakteriobójcze i bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych w przypadku dezynfekcji w obszarze weterynaryjnym, bakteriobójcze i grzybobójcze w przypadku dezynfekcji powierzchni w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej oraz powierzchni mających kontakt z żywnością

Jest skuteczny w niskich temperaturach. Można mieszać z niektórymi preparatami myjącymi, np. Multiclean CS, tworząc roztwór o właściwościach myjąco-dezynfekcyjnych. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

ZASTOSOWANIE:

- W obszarze weterynaryjnym: na fermach hodowlanych, brojlerów, zwierząt futerkowych, w wylęgarniach, schroniskach dla zwierząt, lecznicach weterynaryjnych
- W obiektach użyteczności publicznej i prywatnej: do dezynfekcji obszarów i budynków dotkniętych powodzią, a zagrożonych powstaniem epidemii, w piwnicach, zakładach przeróbki odpadów, środkach transportu, magazynach, w pomieszczeniach po zmarłych itp.
- W przemyśle spożywczym: na powierzchniach mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt

Aplikacja za pomocą opryskiwaczy, sprzętu wysokociśnieniowego a także zamgławiaczy. Preparat można stosować w obecności zwierząt.

DAWKOWANIE STANDARDOWE

1. W obszarze weterynaryjnym

Działanie	Oprysk*	Zalecane stężenie zamgławiania	Czas Działania	Temperatura
Bakteriobójcze	2%	4l/1000m ³	30min	10°C
Grzybobójcze	0,5%	1l/1000m ³	30min	10°C

2. W obiektach użyteczności publicznej i prywatnej oraz w przemyśle spożywczym

Działanie	Oprysk*	Czas działania	Temperatura
Bakteriobójcze	0,25%	60min	20°C
Grzybobójcze	4%	60min	20°C

3. Dawkowanie w pustych szklarniach i tunelach poza cyklami hodowlanymi roślin

Działanie	Oprysk*	Minimalny czas działania	Temperatura
Bakterie	0,25%	60min	20°C
Wirusy	0,5%	120min	15°C
Grzyby	4%	60min	20°C

*zaleca się stosowanie oprysku w ilości 0,3L roztworu roboczego na powierzchnię 1m²

Zabieg należy wykonywać po usunięciu z pomieszczenia wody pitnej i paszy; nie należy podawać preparatu na powierzchnie ciała zwierząt ani poprzez zamgławianie przy użyciu zamgławiaczy spalinowych i elektrycznych.

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Zagrożenia

Acute Tox 4 Toksyczność ostra kat. 4.

Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat 1

Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1

Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kat 1B.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.



