



RAPICID 1L PREPARAT DO DEZYNFEKCJI

Cena brutto	90,30 zł
Cena netto	83,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	ZOETIS

Opis produktu

RAPICID 1 L PREPARAT DO DEZYNFEKCJI

WŁAŚCIWOŚCI

Płynny preparat do dezynfekcji i sanizacji o właściwościach myjących. Właściwości i działanie Rapacid jest połączeniem jodoformu z detergentem. Dzięki temu wykazuje zarówno szerokie spektrum działania wiruso-, bakterio- i grzybobójczego, jak również właściwości myjące. Rapacid inaktywuje m.in. wirusy pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń, pomoru świń, choroby Aujeszkego, wścieklizny, choroby Newcastle i choroby Mareka, niszczy też m.in. *Aspergillus fumigatus*, *Candida albicans* i *Microsporum canis*. Zawartość środków powierzchniowo czynnych ułatwia roztworom roboczym preparatu Rapacid penetrację powierzchni porowatych i trudnych do odkażenia. Roztwory robocze preparatu są stabilne i nie tracą aktywności w obecności substancji i zanieczyszczeń organicznych ani w niskich temperaturach. Roztwory robocze cechują się niską toksycznością, nie wykazują właściwości drażniących ani uczulających, nie niszczą odkażanych powierzchni. W środowisku zewnętrznym preparat ulega biodegradacji.

SKŁAD

- jod aktywny
- kwas fosforowy
- kwas siarkowy
- woda
- środki powierzchniowo czynne

WSKAZANIA

Mycie oraz dezynfekcja pomieszczeń dla wszystkich gatunków zwierząt hodowlanych, środków transportu, wyposażenia laboratoryjnego, weterynaryjnego, zootechnicznego, nasączenie mat dezynfekcyjnych i sanizacja wody. Preparatu nie należy stosować do inaktywacji zarodników bakteryjnych i pratków w warunkach obiektów inwentarskich.

STOSOWANIE

RAPICID jest stosowany w postaci roztworów do polewania, spryskiwania, wycierania lub zanurzania odkażanych przedmiotów, zamgławiania pomieszczeń z użyciem urządzeń wysokociśnieniowych oraz nasączenia mat dezynfekcyjnych i wypełniania basenów przejazdowych. Roztwory robocze sporządza się przez zmieszanie odpowiedniej objętości preparatu z wodą. Temperatura roztworów roboczych nie powinna być wyższa niż 43°C. Przed wykonaniem dezynfekcji właściwej należy usunąć zwierzęta i zbędne wyposażenie z odkażanych pomieszczeń. Nadmiar substancji organicznych należy usunąć mechanicznie, co zwiększa skuteczność wykonywanych zabiegów dezynfekcyjnych.

Zaleca się stosowanie roztworów o następujących stężeniach:

1 : 100/200 - dezynfekcja w ogniskach chorób (w zależności od stopnia zanieczyszczenia powierzchni oraz rodzaju drobnoustroju)

1 : 400 - dezynfekcja ogólna w pomieszczeniach dla zwierząt - maty dezynfekcyjne i baseny przejazdowe

1 : 500 - zamgławianie pomieszczeń w obecności zwierząt

1 : 600 - odkażanie narzędzi i wyposażenia weterynaryjnego, zootechnicznego i laboratoryjnego (przez 10-15 minut) - dezynfekcja jaj w wylęgarniach drobiu

1 : 2500 - sanityzacja wody pitnej dla zwierząt

Po godzinie od zastosowania preparatu odkażane powierzchnie należy spłukać silnym strumieniem wody i pozostawić do wyschnięcia.
Utrata żółtego koloru przez roztwór roboczy wskazuje na konieczność jego wymiany.

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

ZAGROŻENIA

Elementy oznakowania

Niebezpieczeństwo Rapacid zawiera Alkohol (C9-11) etoksyłowy (8EO), kwas siarkowy, kwas fosforowy

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

P260 Nie wdychać mgły.

P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P315 Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Ten produkt nie zawiera substancji PBT i vPvB.